

先発品と後発品で効能効果等に違いのある医薬品リスト

《内服・外用薬》 適応のない場合を塗りつぶしています

当院採用販売名	成分名	違いのある効能・効果
アリセプトD錠3mg アリセプトD錠5mg アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩	レビー小体型認知症
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
(後)カンデサルタン錠8mg「あすか」 ※後発品ですが当院採用のものには適応があります	カンデサルタン シレキセチル	①慢性心不全(軽症～中等症)の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合、 ②小児の高血圧症に対する用法用量
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	①KIT(CD117)陽性消火間質腫瘍 ②FIP1L1- $\text{PDGFR}\alpha$ 陽性の好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	子宮腺筋症に伴う疼痛の改善
トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制
ニフレック配合内用剤	塩化カリウム他	バリウム注腸X線造影検査前処置
(後)ピタバスタチンCa錠2mg「明治」 ※後発品ですが当院採用のものには適応があります	ピタバスタチンカルシウム水和物	家族性高コレステロール血症に対する小児用量
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	再発性単純疱疹の用法用量
フェントステープ1mg フェントステープ2mg フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	中等度から高度の慢性疼痛
プログラフカプセル0.5mg プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎
※プログラフはカプセルと顆粒で適応違いありますのでご注意ください。		
(後)モサプリドクエン酸塩錠5mg 適応無し	モサプリドクエン酸塩水和物	先発品のガスモチン錠5mgに適応あり 経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助
(後)ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 適応無し	ラベプラゾールナトリウム	先発品のパリエット錠10mgに適応あり 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
(後)リスペリドンOD錠1mg「アメル」	リスペリドン	上記適応無し
(後)リセドロネ酸Na錠17.5mg「サワイ」 ※後発品ですが当院採用のものには適応があります	リセドロネ酸ナトリウム水和物	骨ペーজেット病
ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	強迫性障害(小児)
レベトールカプセル200mg	リバビリン	①ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 ②ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤との併用による、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
レミッチカプセル2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	透析患者、慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善
(後)ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 ※後発品ですが当院採用のものには適応があります	ロスバスタチンカルシウム	家族性高コレステロール血症

2020.2. 20作成