

レジメン名

肺がん－CBDCA(AUC6)+PEM

1. 適応疾患：切除不能な進行・再発非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                     | 投与スケジュール |   |   |       |  |  |  |    |    |   |
|-----------------------------------------|----------|---|---|-------|--|--|--|----|----|---|
| 投与方法・投与量（day）                           | 1        | 2 | 3 | ．．．．． |  |  |  | 20 | 21 | 1 |
| CBDCA(カルボプラチン)<br>AUC 6・min/ml/日        | ●        |   |   |       |  |  |  |    |    | ● |
| PEM(ペメトレキセド)<br>500mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |   |   |       |  |  |  |    |    | ● |

〈投与方法〉 3 週を 1 コース ※4～6 コース後、維持療法

〈評価方法〉 1 コースごとに評価

〈上限クール〉

初回投与日の 1 週間前～PEM 最終投与の 3 週間(22 日)後まで

| 投与順 | 薬剤名と投与量           | 投与方法                                     | ペース     |
|-----|-------------------|------------------------------------------|---------|
| ①   | パンビタン<br>1.0g     | 内服<br>初回投与の 1 週間前<br>から最終投与日の<br>3 週間後まで | 分 1 (夕) |
| ②   | フレスミン S<br>1000μg | 筋注<br>初回投与の 1 週間前<br>から最終投与日の<br>3 週間後まで | 9 週間毎に  |

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                                  | 投与方法 | ペース  |
|-----|----------------------------------------------------------|------|------|
| ①   | アロカリス 235mg<br>パロノセトロン 0.75mg<br>デキサート 9.9mg<br>生食 100mL | 点滴   | 30 分 |
| ②   | 生食 50mL                                                  | 点滴   | 全開   |
| ③   | ペメトレキセド ____mg<br>生食(PEM と合計で 100mL) ____mL              | 点滴   | 10 分 |
| ④   | カルボプラチン ____mg<br>生食 250mL                               | 点滴   | 60 分 |
| ⑤   | 生食 50mL                                                  | 点滴   | 全開   |

Day2～4(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量       | 投与方法 | 投与時間      |
|-----|---------------|------|-----------|
| ①   | デカドロン(4mg) 2T | 内服   | 分 2 (朝・昼) |