

レジメン名

肺がん－Pembrolizumab+CBDCA+PEM

1. 適応疾患：化学療法歴のない、EGFR 遺伝子変異陰性及び ALK 融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	・	21	1
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body/日	●					●
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/mL/日	●					●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●					●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース(5 コース目以降は Pembrolizumab+PEM 維持療法)

〈評価方法〉 1 コース毎に評価

〈上限クール〉 4 クール

初回投与日の 1 週間前～PEM 最終投与の 3 週間(22 日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の 1 週間前 から最終投与日の 3 週間後まで	分 1 (夕)
②	フレスミン S 1000μg	筋注 初回投与の 1 週間前 から最終投与日の 3 週間後まで	9 週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ <u>200mg</u> 生食 100mL	点滴	30 分
④	生食 50mL	点滴	経過観察 初回 30 分 →2 回目以降全開
⑤	ペメトレキセド _____mg 生食(PEM と合計で 100mL) _____mL	点滴	10 分
⑥	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑦	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)