

レジメン名

肺がん－Pembrolizumab+PEM（維持療法）

1. 適応疾患：化学療法歴のない、EGFR 遺伝子変異陰性及び ALK 融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
投与方法・投与量（day）	1	・	・	・	21	1
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body/日	●					●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●					●

〈投与方法〉3週を1コース

（Pembrolizumab+CDDP+PEM または Pembrolizumab+CBDCA+PEM を4コース投与後、5コース目以降に維持療法として使用）

〈評価方法〉

〈上限クール〉なし

初回投与日の1週間前～PEM 最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前から最終投与日の3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前から最終投与日の3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	15 分
②	キイトルーダ <u>200mg</u> 生食 100mL	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ペメトレキセド _____mg 生食(PEM と合計で 100mL) _____mL	点滴	10 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2～3（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロロン(4mg) 1T	内服	分 1（朝）