

レジメン名

肺がんーPembrolizumab+CBDCA+nab-PTX

1. 適応疾患：化学療法歴のない、EGFR 遺伝子変異陰性及び ALK 融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	...	8	...	15	...	21	1
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body/日	●							●
CBDCA(カルボプラチン) AUC 6・min/mL/日	●							●
nab-PTX(アブラキサン) 100mg/m ² /日	●		●		●			●

〈投与方法〉3 週を 1 コース(5 コース目以降は Pembrolizumab 維持療法)

〈評価方法〉

〈上限クール〉4 コース

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	生食 50mL	点滴	経過観察 初回 30 分 →2 回目以降全開
⑤	アブラキサン _____mg 生食 100mL ※1V/20mL で溶解し、投与量のみ空ボ トルへ戻す。	点滴	30 分
⑥	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑦	生食 50mL	点滴	全開

Day8,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	15 分
②	アブラキサン _____mg 生食 100mL ※1V/20mL で溶解し、投与量のみ空ボ トルへ戻す。	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)