

レジメン名

肺がん－Pembrolizumab+CBDCA+PTX

1. 適応疾患：化学療法歴のない、EGFR 遺伝子変異陰性及び ALK 融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	.	.	.	.	.	21	1
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body/日	●							●
CBDCA(カルボプラチン) AUC 6・min/mL/日	●							●
PTX(パクリタキセル) 200mg/m ² /日	●							●

〈投与方法〉3週を1コース(5コース目以降は Pembrolizumab 維持療法)

〈評価方法〉2コースごとに評価

〈上限クール〉4コース終了後、維持療法のレジメンへ移行

Day1

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	アロカリス パロノセトロン デキサート ガスター 生食	235mg 0.75mg 16.5mg 20mg 100mL	点滴	30 分
②	生食	50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ 生食	200mg 100mL	点滴	30 分
④	生食	50mL	点滴	経過観察 初回 30 分 →2 回目以降全開
⑤	パクリタキセル 生食	_____mg 500mL	点滴	180 分
⑥	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴	60 分
⑦	生食	50mL	点滴	全開

Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)