

レジメン名

肺がん－Nivolumab+CBDCA+PEM（術前補助療法）

1. 適応疾患：非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)における術前補助療法
(切除可能な臨床病期Ⅱ-ⅢA期)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	・	・	・	21	1
Nivolumab(オプジーボ) 360mg/body/日	●							●
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/mL/日	●							●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●							●

〈投与方法〉術前に3週を1コースで最大3コースまで。

〈評価方法〉1コース毎に評価

〈上限クール〉3コース

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	オブジーボ 360mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	生食 50mL	点滴	経過観察 初回 30 分 →2 回目以降全開
⑤	ペメトレキセド _____mg 生食(PEM と合計で 100mL) _____mL	点滴	10 分
⑥	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑦	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)