

レジメン名

肺がん－CBDCA＋PEM＋Osimertinib

1. 適応疾患：切除不能な進行・再発非小細胞肺がん(ⅢB期・Ⅳ期、EGFR 遺伝子陽性)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール						
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	・・・	20	21	1
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/ml/日	●						●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●						●
Osimertinib(オシメルチニブ) 80mg/日	●	●	●	●	●	●	●

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉1コースごとに評価

〈上限クール〉

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ペメトレキセド _____mg 生食(PEM と合計で 100mL) _____mL	点滴	10 分
④	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	Osimertinib 80mg ×21 日	内服	