

レジメン名

肺がん－CDDP+PEM＋Osimertinib

1. 適応疾患：悪性中皮腫・非小細胞肺がん（ⅢB～Ⅳ期）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール						
投与方法・投与量（day）	1	2	3	・・・	20	21	1
CDDP(シスプラチン) 75mg/m ² /日	●						●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●						●
Osimertinib(オシメルチニブ) 80mg/日	●	●	●	●	●	●	●

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉1コースごとに評価

〈上限クール〉

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	硫酸Mg補正液 4mEq ソリタT3 500mL	点滴	60分

④	ペメトレキセド 生食(PEM と合計で 100mL)	____mg ____mL	点滴	10 分
⑤	マンニトール S	150mL	点滴	15 分
⑥	シスプラチン 生食 (CDDP と合わせて計 500mL)	____mg	点滴	60 分
⑦	生食	500mL	点滴	60 分
⑧	硫酸 Mg 補正液 ソリタ T3	4mEq 500mL	点滴	60 分

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロロン (4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	Osimertinib 80mg ×21 日	内服	