

レジメン名

肺がん－PEM(維持療法)＋Osimertinib

1. 適応疾患：切除不能な進行・再発非小細胞肺がん(ⅢB 期・Ⅳ期)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール						
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	・・・	20	21	1
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●						●
Osimertinib(オシメルチニブ) 80mg/日	●	●	●	●	●	●	●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 1 コースごとに評価

〈上限クール〉

初回投与日の 1 週間前～PEM 最終投与の 3 週間(22 日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の 1 週間前 から最終投与日の 3 週間後まで	分 1 (夕)
②	フレスミン S 1000μg	筋注 初回投与の 1 週間前 から最終投与日の 3 週間後まで	9 週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 6.6mg 100mL	点滴	15 分
②	ペメトレキセド 生食(PEM と合計で 100mL) ____mg ____mL	点滴	10 分
③	生食 50mL	点滴	全開

Day2～3 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン (4mg) 1T	内服	分 1 (朝)

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	Osimertinib 80mg ×21 日	内服	