

レジメン名

肺がん－Pembrolizumab+CDDP+GEM（周術期術前）

1. 適応疾患：非小細胞肺癌(扁平上皮癌)における術前・術後補助療法
(切除可能な臨床病期Ⅱ・ⅢB期)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	8	・	・	21	1
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body/日	●							●
CDDP(シスプラチン) 75mg/m ² /日	●							●
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m ² /日	●			●				●

〈投与方法〉術前に3週を1コースで最大4コースまで。

〈評価方法〉1コース毎に評価

〈上限クール〉4コース

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30分
④	生食 50mL	点滴	経過観察 初回 30分 →2回目以降全開
⑤	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60分
⑥	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
⑦	マンニトール S 150mL	点滴	15分

⑧	シスプラチン 生食(CDDP と合計で 500mL)	<u> </u> mg <u> </u> mL	点滴	60 分
⑨	生食	500mL	点滴	60 分
⑩	硫酸 Mg 補正液 ソリタ T3	4mEq 500mL	点滴	60 分

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴 10 分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	<u> </u> mg 100mL	点滴 30 分
③	生食	50mL	点滴 全開