

レジメン名

肺がん－Pembrolizumab+CDDP+PEM（周術期術前）

1. 適応疾患：非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)における術前・術後補助療法
(切除可能な臨床病期Ⅱ-ⅢB期)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	・	21	1
Pembrolizumab(キイトルーダ) 200mg/body/日	●					●
CDDP(シスプラチン) 75mg/m ² /日	●					●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●					●

〈投与方法〉 術前に3週を1コースで最大4コースまで。

〈評価方法〉 1コース毎に評価

〈上限クール〉 4コース

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	生食 50mL	点滴	経過観察 初回 30 分 →2 回目以降全開
⑤	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60 分
⑥	ペメトレキセド _____mg 生食(PEM と合計で 100mL) _____mL	点滴	10 分
⑦	マンニトール S 150mL	点滴	15 分
⑧	シスプラチン _____mg 生食(CDDP と合計で 500mL) _____mL	点滴	60 分
⑨	生食 500mL	点滴	60 分
⑩	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60 分

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)