

レジメン名

肺がん－CBDCA(AUC5)+PEM

1. 適応疾患：悪性中皮腫、切除不能な進行・再発非小細胞肺がん(ⅢB期・Ⅳ期)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量（day）	1	2	3	．．．．．				20	21	1
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/ml/日	●									●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●									●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉 1コースごとに評価

〈上限クール〉

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス パロノセトロン デキサート 生食 235mg 0.75mg 9.9mg 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ペメトレキセド 生食(PEMと合計で100mL) ____mg ____mL	点滴	10分

④	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴	60 分
⑤	生食	50mL	点滴	全開

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)