

レジメン名

肺がん－CDDP+PEM+BV

1. 適応疾患：切除不能な進行・再発非小細胞肺がん(ⅢB～Ⅳ期)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	・	・	・	・	・	・	・	21	1
CDDP(シスプラチン) 75mg/m ² /日	●											●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●											●
BV(ベバシズマブ) 15mg/kg/日	●											●

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとし、4 コース施行。

SD 以上の効果を有した症例では、PEM+BV の維持療法も検討しうる。

〈評価方法〉 1 コースごとに評価

〈上限クール〉

初回投与日の 1 週間前～PEM 最終投与の 3 週間(22 日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の 1 週間前 から最終投与日の 3 週間後まで	分 1 (夕)
②	フレスミン S 1000μg	筋注 初回投与の 1 週間前 から最終投与日の 3 週間後まで	9 週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60 分

④	ペメトレキセド 生食(PEM と合計で 100mL)	____mg ____mL	点滴	10 分
⑤	マンニトール S	150mL	点滴	15 分
⑥	シスプラチン 生食 (CDDP と合わせて計 500mL)	____mg	点滴	60 分
⑦	生食	500mL	点滴	60 分
⑧	硫酸 Mg 補正液 ソリタ T3	4mEq 500mL	点滴	60 分
⑨	ベバシズマブ 生食	____mg 100mL	点滴	初回 90 分 →2 回目 60 分 →3 回目以降 30 分
⑩	生食	50mL	点滴	全開

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロロン (4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)