

レジメン名

乳がん－FEC (5-FU＋EPI＋CPA)

1. 適応疾患：乳癌、術後補助化学療法 進行・再発

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	・	・	・	・	21	1
5-FU(フルオロウラシル) 500 mg/m ² /日	●								●
EPI(エピルビシン) 90 mg/m ² /日	●								●
CPA(エンドキサン) 500 mg/m ² /日	●								●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

術後補助化学療法 4～6 コース

進行・再発

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	エピルビシン _____mg 生食 50mL	点滴	全開
④	エンドキサン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	フルオロウラシル _____mg 生食 100mL	点滴	60 分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分 2(朝・夕)