

レジメン名

乳がん－TC (DTX＋CPA)＋Trastuzumab (1st)

1. 適応疾患： HER2 陽性乳がん、術後補助化学療法

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール						
	1	2～4	・	・	・	21	1
投与方法・投与量 (day)							
DTX(ドセタキセル) 75 又は 60mg/m ² /日	●						●
CPA(エンドキサン) 600mg/m ² /日	●						●
T-mab(トラスツズマブ) 8mg/kg/日	●						
ペグフィルグラスチム(ジーラスタ) 3.6mg/body/日		●					

※ペグフィルグラスチムは抗がん剤投与後 day2 以降 day4 以内に 1 回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

術後補助化学療法 4 コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パロノセトロン 0.75mg デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	ドセタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
③	エンドキサン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水 (溶解用) 20mL	点滴	90 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4 の間に 1 回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ペグフィルグラスチム 3.6 mg	皮下注	