

レジメン名

乳がん－Perjeta＋Trastuzumab＋PTX（2 サイクル目以降）

## 1. 適応疾患

HER2 陽性の手術不能または再発乳がん

## 2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                    | 投与スケジュール |   |   |     |   |     |    |   |
|----------------------------------------|----------|---|---|-----|---|-----|----|---|
| 投与方法・投与量（day）                          | 1        | 2 | 3 | ・・・ | 8 | ・・・ | 21 | 1 |
| パージェタ<br>420 mg/body                   | ●        |   |   |     |   |     |    | ● |
| トラスツズマブ (T-mab)<br>6mg/kg              | ●        |   |   |     |   |     |    | ● |
| パクリタキセル (PTX)<br>175 mg/m <sup>2</sup> | ●        |   |   |     |   |     |    | ● |

〈投与方法〉3 週を 1 コースとする

day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                  | 投与方法 | ペース             |
|-----|------------------------------------------|------|-----------------|
| ①   | レスタミンコーワ錠 5T                             | 内服   | PTX 投与<br>60 分前 |
| ②   | デキサート 16.5 mg<br>ガスター 20mg<br>生食 100mL   | 点滴   | 30 分            |
| ③   | グラニセトロン 3mg ハッグ 1 袋                      | 点滴   | 30 分            |
| ④   | パージェタ 420mg<br>生食 250mL                  | 点滴   | 30 分            |
| ⑥   | トラスツズマブ mg<br>生食 250mL<br>注射用水（溶解用） 20mL | 点滴   | 30 分            |
| ⑦   | パクリタキセル mg<br>生食 500mL                   | 点滴   | 180 分           |
| ⑧   | 生食 50mL                                  | 点滴   | 全開              |