

レジメン名

乳がん－Perjeta＋Trastuzumab＋Eribulin（1 サイクル目）

1. 適応疾患 HER2 陽性の手術不能または再発乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量（day）	1	2	3	・・・	8	・・・	21	1 (2 サイクル目以降)
パージェタ 840 mg/body	●							● (420mg/body)
トラスツズマブ (T-mab) 8 mg/kg (T-mab 投与継続例は 6mg/kg)	●							● (6mg/kg)
ハラヴェン (Eribulin) 1.4 mg/m ²	●				●			●

〈投与方法〉3 週を 1 コースとする

day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL デキサート 6.6mg	点滴	30 分
②	パージェタ 840mg 生食 250mL	点滴	60 分
③	生食 100mL	点滴	60 分
④	トラスツズマブ (8mg/kg) _____mg (投与継続例では 6mg/kg) 生食 250mL 注射用水（溶解用） 20mL	点滴	90 分
⑤	ハラヴェン _____mg 生食 50mL	点滴	5 分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 デキサート 100mL 6.6mg	点滴	30 分
②	ハラヴェン 生食 _____mg 50mL	点滴	5 分
③	生食 50mL	点滴	全開