

レジメン名

乳がん — CPT-11

## 1. 適応疾患

アンスラサイクリン系あるいはタキサン系抗癌薬の投与歴をもつ転移・再発乳癌

## 2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |  |
|------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|---|---|----|---|--|
| 投与方法・投与量 (day)                                 | 1        | 2 | ・ | 8 | 9 | ・ | 15 | 16 | ・ | 22 | 23 | ・ | ・ | 42 | 1 |  |
| CPT-11<br>(イリノテカン)<br>100 mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |   |   | ● |   |   | ●  |    |   | ●  |    |   |   |    | ● |  |

〈投与方法〉 6週を1コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 無

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                            | 投与方法 | ペース  |
|-----|----------------------------------------------------|------|------|
| ①   | パロノセトロン<br>デキサート<br>生食<br>0.75mg<br>6.6mg<br>100mL | 点滴   | 15 分 |
| ②   | イリノテカン<br>生食<br>_____mg<br>500mL                   | 点滴   | 60 分 |
| ③   | 生食<br>50mL                                         | 点滴   | 全開   |