

レジメン名

乳がんーweeklyPTX+Trastuzumab (1st)

1. 適応疾患：HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                      | 投与スケジュール |     |   |     |    |     |    |             |
|------------------------------------------|----------|-----|---|-----|----|-----|----|-------------|
| 投与方法・投与量 (day)                           | 1        | ・・・ | 8 | ・・・ | 15 | ・・・ | 21 | 1           |
| PTX (パクリタキセル)<br>80 mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |     | ● |     | ●  |     |    | 2 サイ<br>クル目 |
| T-mab(トラスツズマブ)<br>8mg/kg/日               | ●        |     |   |     |    |     |    | 2 サイ<br>クル目 |

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                               | 投与方法 | ペース             |
|-----|-------------------------------------------------------|------|-----------------|
| ①   | レスタミンコーワ錠 5T                                          | 内服   | PTX 投与<br>60 分前 |
| ②   | デキサート 6.6mg<br>ガスター 20mg<br>生食 100mL                  | 点滴   | 30 分            |
| ③   | グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋                                   | 点滴   | 30 分            |
| ④   | パクリタキセル _____mg<br>生食 250mL                           | 点滴   | 60 分            |
| ⑤   | トラスツズマブ(8mg/kg) _____mg<br>生食 250mL<br>注射用水(溶解用) 20mL | 点滴   | 90 分            |
| ⑥   | 生食 50mL                                               | 点滴   | 全開              |

day8, 15

| 投与順 | 薬剤名と投与量                              | 投与方法 | ペース             |
|-----|--------------------------------------|------|-----------------|
| ①   | レスタミンコーワ錠 5T                         | 内服   | PTX 投与<br>60 分前 |
| ②   | デキサート 6.6mg<br>ガスター 20mg<br>生食 100mL | 点滴   | 30 分            |
| ③   | グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋                  | 点滴   | 30 分            |
| ④   | パクリタキセル _____mg<br>生食 250mL          | 点滴   | 60 分            |
| ⑤   | 生食 50mL                              | 点滴   | 全開              |