

レジメン名

乳がん－Perjeta＋Trastuzumab＋CBDCA＋DTX (1st)

1. 適応疾患 手術可能な HER2 陽性の乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
投与方法・投与量 (day)	1	2～4	・・・	・・・	21	1 (2 サイクル目以降)
Perjeta(パージェタ) 840mg/body/日	●					● (420mg/body/日)
T-mab(トラスツズマブ) 8mg/kg/日	●					● (6mg/kg/日)
CBDCA(カルボプラチン) AUC 6 mg・min/mL/日	●					●
DTX(ドセタキセル) 75mg/m ² /日	●					●
ペグフィルグラスチム(ジーラスタ) 3.6mg/body		●				

※ペグフィルグラスチムは抗がん剤投与後 day2 以降 day4 以内に 1 回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 3 週を 1 コース 術前化学療法の場合 4～6 コース

術後化学療法の場合 6 コース

〈評価方法〉 3～4 コース終了時に MRI 等で評価し、PR が得られそうであれば計 6 コース施行する。

〈上限クール〉 6 コース

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	パージェタ 840mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	生食 100mL	点滴	60 分

⑤	トラスツズマブ(8mg/kg) 生食 注射用水(溶解用)	<u> </u> mg 250mL 20mL	点滴	90 分
⑥	ドセタキセル 生食	<u> </u> mg 250mL	点滴	60 分
⑦	カルボプラチン 生食	<u> </u> mg 250mL	点滴	60 分
⑧	生食	50mL	点滴	全開

Day2～4 の間に 1 回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ペグフィルグラスチム 3.6 mg	皮下注	

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分 2 (朝・昼)