

レジメン名

乳がん－Pembrolizumab (Q3W) + CBDCA + GEM

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール						
	1	・	8	・	・	21	1
Pembrolizumab (キイトルーダ®) 200mg/body/日	●						●
CBDCA (カルボプラチン) AUC2・min/mL/日	●		●				●
GEM (ゲムシタビン) 1000 mg/m ² /日	●		●				●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉 3～4コースごとにCT等で評価

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バック® デキサート	1袋 6.6 mg	点滴 15分
②	キイトルーダ® 生食	200mg 100mL	点滴 30分
③	生食	50mL	点滴 初回 30分 2回目以降全開
④	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	_____mg 100mL	点滴 30分
⑤	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴 60分
⑥	生食	50mL	点滴 全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バック デキサート	1 袋 6.6 mg	点滴 15 分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	_____ mg 100mL	点滴 30 分
③	カルボプラチン 生食	_____ mg 250mL	点滴 60 分
④	生食	50mL	点滴 全開

Day2, 3, 9, 10(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン	8 mg	内服 分 2 (朝・昼)