

レジメン名

乳がん－Pembrolizumab (Q6W) + CBDCA + GEM

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	・	8	・	・	22	・	29	・	42	1
Pembrolizumab (キイトルーダ®) 400mg/body/日	●										●
CBDCA (カルボプラチン) AUC2・min/mL/日	●		●			●		●			●
GEM (ゲムシタビン) 1000 mg/m ² /日	●		●			●		●			●

〈投与方法〉6週を1コース

〈評価方法〉3～4コースごとにCT等で評価

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バック [®] 1袋 デキサート 6.6 mg	点滴	15分
②	キイトルーダ [®] 400mg 生食 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	初回 30分 2回目以降全開
④	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
⑤	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day8, 22, 29

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バック デキサート 1 袋 6.6 mg	点滴	15 分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 mg 100mL	点滴	30 分
③	カルボプラチン 生食 mg 250mL	点滴	60 分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day2, 3, 9, 10, 23, 24, 30, 31 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8 mg	内服	分 2 (朝・昼)