

レジメン名

乳がん－Pembrolizumab (Q6W) ＋ nab-PTX

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	84	1
Pembrolizumab (キイトルーダ) 400mg/body/日	●						●							●
nab-PTX (アブラキサン) 100mg/m ²	●	●	●		●	●	●		●	●	●			●

〈投与方法〉12 週を 1 コース

〈評価方法〉8～18 週ごとに CT 等で評価

〈上限クール〉

Day1, 43

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6 mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	キイトルーダ 400mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	初回 30 分 2 回目以降全開
④	アブラキサン _____ mg 生食 100mL	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8, 15, 29, 36, 57, 64, 71

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6 mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	アブラキサン _____ mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開