

レジメン名

乳がん－Pembrolizumab (Q6W) +PTX

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	84	1
Pembrolizumab (キイトルーダ®) 400mg/body/日	●						●							●
PTX (パクリタキセル) 90mg/m ²	●	●	●		●	●	●		●	●	●			●

〈投与方法〉 12 週を 1 コース

〈評価方法〉 8～18 週ごとに CT 等で評価

〈上限ルール〉

Day1, 43

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6 mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	グラニセトロン 3mg ハック® 1 袋	点滴	30 分
③	キイトルーダ® 400mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	生食 50mL	点滴	初回 30 分 2 回目以降全開
⑤	パクリタキセル _____ mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day8, 15, 29, 36, 57, 64, 71

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6 mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋	点滴	30 分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 (内服)

	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前