

レジメン名

乳がん－Pembrolizumab + AC (DXR + CPA)

1. 適応疾患：高リスクの早期トリプルネガティブ乳がんへの周術期治療【術前②】

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2～4	.	.	.	.	.	21	1
Pembrolizumab (キイトルーダ®) 200mg/body/日	●								●
DXR(ドキシソルビシン) 60mg/m ² /日	●								●
CPA(エンドキサン) 600mg/m ² /日	●								●
ペグフィルグラスチム(ジーラスタ) 3.6mg/body		●							

※ペグフィルグラスチムは抗がん剤投与後 day2 以降 day4 以内に 1 回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 4 コース

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	生食 50mL	点滴	初回 30 分 →2 回目以降全開
⑤	ドキシソルビシン _____mg 生食 50mL	点滴	全開

⑥	生食	50mL	点滴	全開
⑦	エンドキサン 生食	_____mg 250mL	点滴	60 分
⑧	生食	50mL	点滴	全開

Day2～4 の間に 1 回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ペグフィルグラスチム 3.6 mg	皮下注	

Day2～4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)