

レジメン名

乳がんーweeklyPTX＋フェスゴ（2サイクル以降）

1. 適応疾患

HER2 陽性の乳がん(術前・術後薬物療法の場合は、PTX は 12 回まで、フェスゴの投与期間は合計 12 ヶ月まで)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1
PTX(パクリタキセル) 80mg/m ²	●		●		●			●
フェスゴ配合皮下注 MA (維持用量)	●							●

IN : 15mL (ペルツズマブ 1200mg+トラスツズマブ 600mg)

MA : 10mL (ペルツズマブ 600mg+トラスツズマブ 600mg)

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとする

〈評価方法〉 周術期：投与終了後(術後 1 年)を目途に CT 等での画像評価

転移・再発：3～4 コースを目途に CT 等で画像評価

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋	点滴	30 分
③	フェスゴ配合皮下注 MA (維持用量) 10mL	皮下注 (大腿部)	5 分以上かけて
④	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋	点滴	30 分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1, 8, 15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	PTX 投与 60 分前