

レジメン名

乳がん－GEM＋フェスゴ（1 サイクル目）

1. 適応疾患 HER2 陽性の転移・再発乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量（day）	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1 (2 サイクル目以降)
GEM(ゲムシタビン) 1250mg/m ²	●		●					●
フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量)	●							● MA (維持用量)

IN : 15mL (ペルツズマブ 1200mg+トラスツズマブ 600mg)

MA : 10mL (ペルツズマブ 600mg+トラスツズマブ 600mg)

〈投与方法〉3 週を 1 コースとする

〈評価方法〉3～4 コースを目途に CT 等で画像評価

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg グラニセトロン 3mg バッグ [※] 1 袋	点滴	30 分
②	フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量) 15mL	皮下注 (大腿部)	8 分以上かけて
③	生食 50mL	点滴	30 分 (経過観察用)
④	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg グラニセトロン 3mg バッグ [※] 1 袋	点滴	30 分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開