

レジメン名

乳がんーAC (DXR+CPA) (ジーラスタボディーポッド)

1. 適応疾患：乳癌、術前・術後補助化学療法、進行・再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	.	.	.	.	.	21	1
DXR(ドキシソルビシン) 60mg/m ² /日	●							●
CPA(エンドキサン) 600mg/m ² /日	●							●
ペグフィルグラスチム (ジーラスタボディーポッド) 3.6mg/body/日	●							●

※ペグフィルグラスチムは抗がん剤投与当日に装着→27 時間後に自動で皮下に注入される。

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

術前・術後補助化学療法 4 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	ドキシソルビシン _____mg 生食 50mL	点滴	全開
③	生食 50mL	点滴	DXR フラッシュ用
④	エンドキサン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開
⑥	ジーラスタ皮下注ボディーポッド 3.6 mg	皮下注	

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分 2 (朝・夕)