

レジメン名

胃がん－Capecitabine＋CDDP

1. 適応疾患：進行・再発胃がん（1st line のみ適応）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量（day）	1	2	・・・		7	・・・		14	・・・		21	1
Cape(カペシタビン) 2000mg/m ² /日	●	●	●	●	●	●	●	●				●
CDDP(シスプラチン) 80mg/m ² /日	●											●

Cape 用量(C 法に準じて)

体表面積	1 回用量(錠数)	1 日用量(錠数)
1.36 m ² 未満	1,200mg(4 錠)	2,400mg(8 錠)
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1,500mg(5 錠)	3,000mg(10 錠)
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1,800mg(6 錠)	3,600mg(12 錠)
1.96 m ² 以上	2,100mg(7 錠)	4,200mg(14 錠)

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 無

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	KCL(20mEq/20mL) 0.5A 硫酸 Mg 補正液 0.5A ソルデム 1 号 500mL	点滴	60 分
④	生食 250mL	点滴	30 分
⑤	マンニトール S 200mL	点滴	30 分

⑥	シスプラチン _____mg 生食(500mL) _____mL (シスプラチンと合計で 500mL とする)	点滴	60 分
⑦	ソルデム 1 号 500mL KCL(20mEq/20mL) 0.5A	点滴	60 分
⑧	ソルデム 1 号 500mL	点滴	60 分

Day1～14（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	カペシタビン _____mg×14 日間 (2 週内服、1 週休薬)	内服	分 2(朝・夕) day1 タ～内服開始

Day1～21（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ピドキサール 6T	内服	分 3(毎食後) 1 コース目 day1 タ～ 内服開始

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8 mg	内服	分 2(朝・昼)