

レジメン名

胃がん－Capecitabine＋Trastuzumab (1st)

1. 適応疾患：HER2 陽性進行・再発胃がん（1st line のみ適応）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量（day）	1	2	・・・	6	7	・・・	14	・・・	21	1
Cape(カペシタビン) 2000mg/m ² /日	●	●	●	●	●	●	●	●		●
T-mab(トラスツズマブ) 8mg/kg/日	●									

Cape 用量(C 法に準じて)

体表面積	1 回用量(錠数)	1 日用量(錠数)
1.36 m ² 未満	1,200mg(4 錠)	2,400mg(8 錠)
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1,500mg(5 錠)	3,000mg(10 錠)
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1,800mg(6 錠)	3,600mg(12 錠)
1.96 m ² 以上	2,100mg(7 錠)	4,200mg(14 錠)

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 有(Capecitabine＋T-mab 2nd)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 50mL	点滴	ルート確保用
②	トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水(溶解用) 20mL	点滴	90 分
③	生食(①の残り) 50mL	点滴	経過観察用

(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	カペシタビン _____mg×14 日間 (2 週内服、1 週休薬)	内服	分 2(朝・夕) day1 夕～内服開始
②	ピドキサール 6T×21 日	内服	分 3(毎食後) 1 コース目 day1 夕～ 内服開始