

レジメン名

胃がん－Trastuzumab Deruxtecan

1. 適応疾患

がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発胃がん
(Trastuzumab を含む化学療法による治療歴のある患者の三次治療以降)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	...	21	1
Trastuzumab Deruxtecan (エンハーツ) 6.4mg/kg/日	●					●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 3～4 コース終了毎に CT 等で評価し、投与継続か判断

〈上限ルール〉

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30 分
②	5%ブドウ糖 100mL (フラッシュ用、残りを投与順④で使用)	点滴	流し
③	エンハーツ _____mg 5%ブドウ糖 100mL 注射用蒸留水(溶解用) 20mL (1V/Aq 5mL で溶解)	点滴	初回 90 分 2 回目以降 30 分
④	5%ブドウ糖 (②の残りを使用) 100mL	点滴	全開