

レジメン名

胃がんーTAS-102+Ramucirumab

1. 適応疾患：治癒切除不能な進行・再発胃癌（2ndline 以降）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール																		
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	…	28	1	
Ramucirumab(サイラムザ) 8mg/kg	●														●			●	
TAS-102 (ロンサーフ) 35mg/m ² ×2/日	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●						●	

TAS-102 初回基準量(トリフルリジン相当量)

体表面積	1 回用量	1 日用量
1.07 m ² 未満	35mg	70mg
1.07 m ² 以上 1.23 m ² 未満	40mg	80mg
1.23 m ² 以上 1.38 m ² 未満	45mg	90mg
1.38 m ² 以上 1.53 m ² 未満	50mg	100mg
1.53 m ² 以上 1.69 m ² 未満	55mg	110mg
1.69 m ² 以上 1.84 m ² 未満	60mg	120mg
1.84 m ² 以上 1.99 m ² 未満	65mg	130mg
1.99 m ² 以上 2.15 m ² 未満	70mg	140mg
2.15 m ² 以上	75mg	150mg

〈投与方法〉 4 週を 1 コース TAS-102 は day1-5,day8-12 に内服、RAM は day1,15 に投与

〈評価方法〉 CT により RECIST 基準と腫瘍マーカーにより評価

〈上限クール〉

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ポララミン 5mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	サイラムザ _____mg 生食 250mL	点滴	初回 60 分 →2 回目以降 30 分
③	生食 50mL	点滴	1 コース目は 60 分観察 忍容性良好なら 2 コース目以降は全開で可

Day1～5, 8～12 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ロンサーフ _____mg	内服	分2 (朝・夕)