

レジメン名

胃がん－CAPOX (Capecitabine + L-OHP) + Trastuzumab (1st)

1. 適応疾患：HER2 陽性の切除不能進行・再発胃がん（1st line）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール									
	1	2	・	・	・	14	・	・	21	1
Cape (カペシタビン) 2000mg/m ² /日	●	●	●	●	●	●				●
L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m ² /日	●									●
T-mab(トラストズマブ) 8mg/kg/日	●									●

Cape 用量

体表面積	1 回用量(錠数)	1 日用量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4 錠)	2400mg(8 錠)
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500mg(5 錠)	3000mg(10 錠)
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800mg(6 錠)	3600mg(12 錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7 錠)	4200mg(14 錠)

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 CT により RECIST 基準により評価

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ピドキサール(10) 6T×21 日	内服	分 3 (毎食後) day1 夕～内服
②	カペシタビン _____mg×14 日	内服	分 2 (朝夕食後) day1 夕～内服
③	デキサート 8.25mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30 分

④	トラスツズマブ 生食 注射用水(溶解用)	_____mg 250mL 20mL	点滴	90分
⑤	生食 100mL		点滴	60分
⑥	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	_____mg 500mL	点滴	120分
⑦	5%ブドウ糖	100mL	点滴	L-OHPと同じ ペースで