

レジメン名

大腸がん－CPT－11＋C－mab（2nd）

1. 適応疾患：EGFR 陽性の切除不能な進行・再発大腸癌の 2nd・3rd 治療

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール															
投与方法・投与量（day）	1		8		15		22		29		36		43		49	1
CPT-11（イリノテカン） 150 mg/m ² /日	●				●				●							●
C-mab（アービタックス） 250 mg/m ² /日	●		●		●		●		●		●		●			●

〈投与方法〉 7週を1コース

〈評価方法〉 CTにより RECIST 基準により評価

〈併用レジメン〉 有（CPT－11＋C－mab 1st）

〈上限クール〉

day 1, 15, 29

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ヘパリン Na ロック 1本	静注	投与前 ポートフラッシュ
②	レスタミンコーワ 5T	内服	C-mab の 30 分前
③	パロノセトロン 0.75mg デキサート 8.25 mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	アービタックス _____mg 生食 250ml	点滴	60 分
⑤	生食 100ml	点滴	60 分
⑥	イリノテカン _____mg 生食 500ml	点滴	90 分
⑦	生食 50ml	点滴	全開
⑧	ヘパリン Na ロック 1本	静注	投与後 ポートフラッシュ

day 8, 22, 36, 43

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ヘパリン Na ロック 1 本	静注	投与前 ポートフラッシュ
②	レスタミンコーワ 5 T	内服	C-mab の 30 分前
③	デキサート 8.25 mg 生食 100ml	点滴	30 分
④	アービタックス _____mg 生食 250ml	点滴	60 分
⑤	生食 100ml	点滴	60 分
⑥	ヘパリン Na ロック 1 本	静注	投与後 ポートフラッシュ