

レジメン名

大腸がん－CAPOX (Capecitabine＋L-OHP)

1. 適応疾患：進行・再発大腸がん、ⅢA・B 期術後補助療法

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量 (day)	1	2	・	・	・	14	・	・	21	1
Cape (カペシタビン) 2000mg/m ² /日	●	●	●	●	●	●				●
L-OHP(オキサリプラチン) 130mg/m ² /日	●									●

Cape 用量

体表面積	1 回用量(錠数)	1 日用量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4 錠)	2400mg(8 錠)
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500mg(5 錠)	3000mg(10 錠)
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800mg(6 錠)	3600mg(12 錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7 錠)	4200mg(14 錠)

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 CT により RECIST 基準により評価

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ピドキサール(10) 6T×21 日	内服	分 3 (毎食後) 1 コース目 day1 タ～ 内服開始
②	カペシタビン _____mg×14 日	内服	分 2 (朝・夕) day1 タ～内服開始
③	デキサート 8.25mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	オキサリプラチン _____mg 5%ブドウ糖 500mL	点滴	120 分
⑤	5%ブドウ糖 100mL	点滴	L-OHP と同じ ペースで