

レジメン名

大腸がんーTAS-102+BV

1. 適応疾患：切除不能な進行再発大腸癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	…	28	1
投与方法・投与量 (day)																		
BV(ベバシズマブ) 5mg/kg	●														●			●
TAS-102 (ロンサーフ) 35mg/m ² ×2/日	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●						●

TAS-102 初回基準量(トリフルリジン相当量)

体表面積	1回用量	1日用量
1.07 m ² 未満	35mg	70mg
1.07 m ² 以上 1.23 m ² 未満	40mg	80mg
1.23 m ² 以上 1.38 m ² 未満	45mg	90mg
1.38 m ² 以上 1.53 m ² 未満	50mg	100mg
1.53 m ² 以上 1.69 m ² 未満	55mg	110mg
1.69 m ² 以上 1.84 m ² 未満	60mg	120mg
1.84 m ² 以上 1.99 m ² 未満	65mg	130mg
1.99 m ² 以上 2.15 m ² 未満	70mg	140mg
2.15 m ² 以上	75mg	150mg

〈投与方法〉 4週を1コース TAS-102は day1-5,day8-12に内服、BVは day1,15に投与

〈評価方法〉 CTにより RECIST 基準と腫瘍マーカーにより評価

〈上限ルール〉

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	ベバシズマブ _____mg 生食 100mL	点滴	初回 90分 →2回目 60分 →3回目以降 30分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1～5, 8～12 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ロンサーフ _____mg	内服	分2 (朝・夕)