

レジメン名

大腸がん－Encorafenib＋Binimetinib＋C-mab (q2w)

1. 適応疾患：がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール						
	1	2	3	・	・	14	1
C-mab(アービタックス) 500mg/m ² /日	●						●
Encorafenib (ビラフトビ) 300mg/日	●	●	●	●	●	●	●
Binimetinib (メクトビ) 90mg/日	●	●	●	●	●	●	●

〈投与方法〉14日を1コース

〈評価方法〉CTにより RECIST 基準により評価

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	PICC・CV ポート用生食注シリンジ 10mL	静注	投与前 ポートフラッシュ
②	レスタミンコーワ 5T	内服	C-mab の 30分前
③	デキサート 8.25mg 生食 100mL	点滴	30分
④	アービタックス _____mg 生食 250mL	点滴	120分
⑤	生食 100mL	点滴	60分
⑥	CV ポート用ヘパフラッシュ 1本	静注	投与後 ポートフラッシュ

Day1～14

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	エンコラフェニブ (ビラフトビ) 300mg/日	内服	1日1回
②	ビニメチニブ (メクトビ) 45mg/回×2	内服	1日2回