

## レジメン名

大腸がん－Encorafenib＋C-mab（q2w）

1. 適応疾患：がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する  
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

## 2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                       | 投与スケジュール |   |   |   |   |    |   |
|-------------------------------------------|----------|---|---|---|---|----|---|
| 投与方法・投与量（day）                             | 1        | 2 | 3 | ・ | ・ | 14 | 1 |
| C-mab(アービタックス)<br>500mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |   |   |   |   |    | ● |
| Encorafenib (ビラフトビ)<br>300mg/日            | ●        | ● | ● | ● | ● | ●  | ● |

〈投与方法〉14日を1コース

〈評価方法〉CTにより RECIST 基準により評価

〈上限クール〉

## Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                     | 投与方法 | ペース              |
|-----|-----------------------------|------|------------------|
| ①   | PICC・CV ポート用生食注シリンジ 10mL    | 静注   | 投与前<br>ポートフラッシュ  |
| ②   | レスタミンコーワ 5T                 | 内服   | C-mab の<br>30 分前 |
| ③   | デキサート 8.25mg<br>生食 100mL    | 点滴   | 30 分             |
| ④   | アービタックス _____mg<br>生食 250mL | 点滴   | 120 分            |
| ⑤   | 生食 100mL                    | 点滴   | 60 分             |
| ⑥   | CV ポート用ヘパフラッシュ 1本           | 静注   | 投与後<br>ポートフラッシュ  |

## Day1～14

| 投与順 | 薬剤名と投与量                | 投与方法 | ペース  |
|-----|------------------------|------|------|
| ①   | エンコラフェニブ（ビラフトビ）300mg/日 | 内服   | 1日1回 |