

レジメン名

胆道がん－Pembrolizumab＋GEM（維持療法）

1. 適応疾患： 治癒切除不能胆道がん

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名<br>投与方法・投与量（day）                    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   | 1        | ・ | ・ | 8 | ・ | ・ | ・ | 21 | 1 |
| Pembrolizumab(キイトルーダ)<br>200mg/body     | ●        |   |   |   |   |   |   |    | ● |
| GEM(ゲムシタビン)<br>1000mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |   |   | ● |   |   |   |    | ● |

〈投与方法〉 3週間を1コース

※Pembrolizumab＋CDDP＋GEM（最大8コース）が終了後に維持療法として使用

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉 27コース(Pembrolizumab：最大35コースまで)

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                         | 投与方法 | ペース |
|-----|---------------------------------|------|-----|
| ①   | グラニセトロンバッグ 3mg                  | 点滴   | 15分 |
| ②   | キイトルーダ 200mg<br>生食 100mL        | 点滴   | 30分 |
| ③   | 生食 50mL                         | 点滴   | 全開  |
| ④   | ゲムシタビン _____mg<br>5%ブドウ糖液 100mL | 点滴   | 30分 |
| ⑤   | 生食 50mL                         | 点滴   | 全開  |

Day8

| 投与順 | 薬剤名と投与量                         | 投与方法 | ペース |
|-----|---------------------------------|------|-----|
| ①   | グラニセトロンバッグ 3mg                  | 点滴   | 15分 |
| ②   | ゲムシタビン _____mg<br>5%ブドウ糖液 100mL | 点滴   | 30分 |
| ③   | 生食 50mL                         | 点滴   | 全開  |