

レジメン名

膵・消化管神経内分泌腫瘍－STZ＋5-FU

1. 適応疾患：膵・消化管神経内分泌腫瘍(NET)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	・	・	・	・	42	1
STZ (ザノサー) 500mg/m ² /日	●	●	●	●	●						●
5-FU (フルオロウラシル) 400mg/m ² /日	●	●	●	●	●						●

〈投与方法〉5日間連続点滴静脈内投与し、37日間休薬する。

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 500mL	点滴	120 分
②	アロカリス 235mg グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋 デキサート 9.9mg	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ザノサー _____mg 生食 100mL	点滴	30 分
⑤	フルオロウラシル _____mg	静注	ゆっくり
⑥	生食 250mL	点滴	60 分

Day2～5

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 500mL	点滴	120 分
②	グラニセトロン 3mg バッグ デキサート 9.9mg	点滴	30 分
③	ザノサー _____mg 生食 100mL	点滴	30 分
④	フルオロウラシル _____mg	静注	ゆっくり
⑤	生食 250mL	点滴	60 分