

レジメン名

卵巣がんーGC (GEM+ CBDCA)

1. 適応疾患：がん化学療法後に増悪した卵巣がん（卵管がん，腹膜がん） 2nd line

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	8	・	・	21	1
CBDCA (カルボプラチン) AUC4・min./mL/日	●							●
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m ² /日	●			●				●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉 1コースごとに腫瘍マーカーで評価、2～3コースごとに CT で評価

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
④	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	120分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	グラニセトロン 3mg バッグ 1袋 デキサート 6.6mg	点滴	30分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分2(朝・昼)