

レジメン名

卵巣がん-DXL

1. 適応疾患：卵巣がん（卵管がん，腹膜がん）

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名 | 投与スケジュール | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--|---|--|----|-----|----|---|
| 投与方法・投与量 (day) | 1 | | 8 | | 15 | ... | 28 | 1 |
| DXL (ドキシル) 50mg/m ² /日 | ● | | | | | | | ● |

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉 1コースごとに評価

〈上限クール〉

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | | 投与方法 | ペース |
|-----|--|---------------|------|----------|
| ① | グラニセトロン 3mg バッグ デキサート | 1 袋 6.6 mg | 点滴 | 30 分 |
| ② | 5%ブドウ糖 (100mL) | 25mL | 点滴 | 10 分 |
| ③ | 【90 mg未満の時】 ドキシル _____mg 5%ブドウ糖 250mL 【90 mg以上の時】 ドキシル _____mg 5%ブドウ糖 500mL | | 点滴 | 1mg/分以上で |
| ④ | 5%ブドウ糖 (100mL) (②の残を使用) | 75mL | 点滴 | ③と同じペースで |