

レジメン名

卵巣がん－DXL＋GEM

1. 適応疾患：がん化学療法後に増悪した卵巣がん、卵管がん、腹膜がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量(day)	1	2	3	・・・	8	・・・	15	・・・	28	1
DXL(ドキシル) 30 mg/m ² /日	●									●
GEM(ゲムシタビン) 600 mg/m ² /日	●				●					●

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉1コースごとに評価

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パロノセトロン 0.75mg デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30分
③	5%ブドウ糖(100mL) 50mL	点滴	流し
④	ドキシル _____mg 5%ブドウ糖 250mL	精密持続点滴 (ポンプ使用)	1mg/分を超えない速度で
⑤	5%ブドウ糖(100mL) 50mL (③の残を使用)	点滴	④と同じペース

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg ^{ハッグ} 1袋 デキサート 6.6mg	点滴	30分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開