レジメン名

卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌 stageⅢ以上 - CPB(CABCA+PTX+BV)

1. 適応患者：卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌 FIGOstageⅢ以上

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量(day)	1	2	3	・	・	・	・	・	21	1
PTX (パクリタキセル) 175mg/m ² /日	●									●
CBDCA (カルボプラチン) AUC6・min/mL/日	●									●
BV (ベバシズマブ) 15mg/kg/日										● 2コース目以降 から開始

〈投与方法〉 3週間を1コース（1コース目はBV併用せず）

〈評価方法〉 1カ月毎にCT等で評価し、病勢が増悪するまで継続

〈上限クール〉 CP+BV併用投与時：最大6サイクルまで

BV単独投与時：最大21サイクルまで（PDまで）

〈適応設定〉 大きな手術を行った場合、少なくとも28日間経過後に投与

※1コース目のみ※

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 16.5mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15分
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30分
③	パクリタキセル _____mg 生食 500mL	点滴	180分

④	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴	60分
⑤	生食	50mL	点滴	全開

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5錠	内服	PTX 投与 30分前

Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分2(朝・夕)

※2 コース目以降※

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート ガスター 生食	16.5mg 20mg 50mL	点滴 15分
②	アロカリス パロノセトロン 生食	235mg 0.75mg 100mL	点滴 30分
③	パクリタキセル 生食	_____mg 500mL	点滴 180分
④	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴 60分
⑤	ベバシズマブ 生食	_____mg 100mL	点滴 初回 90分 →2回目 60分→ 3回目以降 30分
⑥	生食	50mL	点滴 全開

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5錠	内服	PTX 投与 30 分前

Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分2(朝・夕)