

レジメン名

卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌 stageⅢ以上 -

【PTX 不可限定】CDB (CABCA+DTX+BV)

1. 適応疾患：卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌 FIGOstageⅢ以上【PTX 使用不可患者のみ】

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量(day)	1	2	3	・	・	・	・	・	21	1
DTX(ドセタキセル) 75mg/m ² /日	●									●
CBDCA(カルボプラチン) AUC6・min/mL/日	●									●
BV(ベバシズマブ) 15mg/kg/日										● 2コース目以降 から開始

〈投与方法〉3週間を1コース(1コース目はBV併用せず)

〈評価方法〉1ヶ月毎にCT等で評価し、病勢が増悪するまで継続

〈併用レジメン〉無

〈上限クール〉CD+BV併用投与時：最大6サイクルまで

BV単独投与時：最大21サイクルまで(PDまで)

〈適応設定〉大きな手術を行った場合、少なくとも28日間経過後に投与

※1コース目のみ※

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ドセタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分

卵巣がん

④	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴	60 分
⑤	生食	50mL	点滴	全開

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分 2 (朝・昼)

※2 コース目以降※

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	アロカリス パロノセトロン デキサート 生食	235mg 0.75mg 9.9mg 100mL	点滴 30 分
②	生食	50mL	点滴 全開
③	ドセタキセル 生食	_____mg 250mL	点滴 60 分
④	カルボプラチン 生食	_____mg 250mL	点滴 60 分
⑤	ベバシズマブ 生食	_____mg 100mL	点滴 初回 90 分 →2 回目 60 分 →3 回目以降 30 分
⑥	生食	50mL	点滴 全開

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分 2 (朝・昼)