

レジメン名

子宮体がん－IAP (IFM＋THP＋CDDP)

1. 適応疾患：子宮体がん（子宮平滑筋肉腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	・	・	・	・	28	1
IFM(イホマイド) 1200mg/m ² /日	●	●	●						●
THP(ピノルビン) 50mg/m ² /日	●								●
CDDP(シスプラチン) 20mg/m ² /日	●	●	●						●

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉1コースごとに評価

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ハルトマン 500mL	点滴	2 時間
②	ソリタ T3 500mL	点滴	2 時間
③	アロカリス 235mg グラニセトロンバッグ 3mg 1 袋 デキサート 9.9mg	点滴	30 分
④	ピノルビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	全開
⑤	生食 50mL	点滴	全開
⑥	ウロミテキサン 400mg	静注	IFM 投与時
⑦	イホマイド _____mg 生食 500mL	点滴	2 時間

子宮体がん

⑧	シスプラチン 生食(500mL) (シスプラチンと合計で 500mL とする)	_____mg _____mL	点滴	60 分
⑨	ウロミテキサン	400mg	静注	IFM 投与開始 4 時間後
⑩	マンニトール S	300mL	点滴	90 分
⑪	ラシックス 生食	20mg 100mL	点滴	30 分
⑫	ウロミテキサン	400mg	静注	IFM 投与開始 8 時間後
⑬	ハルトマン	500mL	点滴	2 時間
⑭	ソリタ T3	500mL	点滴	2 時間

Day2～3

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	ハルトマン	500mL	点滴	2 時間
②	ソリタ T3	500mL	点滴	2 時間
③	グラニセトロンバッグ 3mg デキサート	1 袋 9.9mg	点滴	30 分
④	ウロミテキサン	400mg	静注	IFM 投与时
⑤	イホマイド 生食	_____mg 500mL	点滴	2 時間
⑥	シスプラチン 生食(500mL) (シスプラチンと合計で 500mL とする)	_____mg _____mL	点滴	60 分
⑦	ウロミテキサン	400mg	静注	IFM 投与開始 4 時間後
⑧	マンニトール S	300mL	点滴	90 分
⑨	ラシックス 生食	20mg 100mL	点滴	30 分
⑩	ウロミテキサン	400mg	静注	IFM 投与開始 8 時間後

子宮体がん

⑪	ハルトマン	500mL	点滴	2 時間
⑫	ソリタ T3	500mL	点滴	2 時間

Day4～6（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分 2 (朝・昼)