

レジメン名

尿路上皮がん－GC(GEM＋CDDP)

1. 適応疾患：尿路上皮がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量（day）	1	2	・・・		8	・・・		15	・・・		28	1
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m ² /日	●				●			●				●
CDDP(シスプラチン) 70mg/m ² /日		●										

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1, 8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ヘパリン Na ロック 1本	静注	フラッシュ用

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	硫酸 Mg 補正液(20mEq/20mL) 0.5A ソルデム 1 500mL	点滴	90分
②	KCL(20mEq/20mL) 0.5A ソルデム 1 500mL	点滴	90分
③	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分

④	マンニトール S	200mL	点滴	60 分
⑤	シスプラチン _____mg 生食 _____mL (シスプラチンと合計で 500mL)		点滴	90 分
⑥	KCL(20mEq/20mL) 0.5A ソルデム 1 500mL		点滴	90 分
⑦	ソルデム 1	500mL	点滴	90 分
⑧	ヘパリン Na ロック	1 本	静注	フラッシュ用

Day3

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴	30 分
②	ソルデム 1	500mL	点滴	80mL/h
③	ヘパリン Na ロック	1 本	静注	フラッシュ用

Day4

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴	30 分
②	ソルデム 1	500mL	点滴	80mL/h

Day5

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30 分