

レジメン名

尿路上皮がん－GEM＋CBDCA

1. 適応疾患：尿路上皮がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	・・・	8	・・・	15	・・・	28	1
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m <sup>2</sup> /日	●		●		●			●
CBDCA(カルボプラチン) AUC 4～5・min./mL/日	●							●

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30分
④	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	90分
⑤	生食 50mL	点滴	全開
⑥	ヘパリンNa ロック 1本	静注	フラッシュ用

Day2～3

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30分
②	ヘパリンNa ロック 1本	静注	フラッシュ用

## Day4

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴 30分

## Day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴 30分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖	_____mg 100mL	点滴 30分
③	生食	50mL	点滴 全開
④	ヘパリン Na ロック	1本	静注 フラッシュ用