

レジメン名

尿路上皮がん－GCP(GEM＋CDDP＋PTX)

1. 適応疾患：尿路上皮がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量（day）	1	2	・・・		8	・・・		21～28	1
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m ² /日	●				●				●
CDDP(シスプラチン) 70mg/m ² /日		●							
PTX(パクリタキセル) 80mg/m ² /日	●				●				●

〈投与方法〉 3～4 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1, 8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 9.9mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30 分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	生食 50mL	点滴	全開
⑤	ヘパリン Na ロック 1 本	静注	フラッシュ用

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	硫酸 Mg 補正液(20mEq/20mL) 0.5A ソルデム 1 500mL	点滴	90 分
②	KCL(20mEq/20mL) 0.5A ソルデム 1 500mL	点滴	90 分

尿路上皮

③	アロカリス パロノセトロン デキサート 生食	235mg 0.75mg 9.9mg 100mL	点滴	30 分
④	マンニトール S	200mL	点滴	60 分
⑤	シスプラチン 生食 (シスプラチンと合計で 500mL)	_____mg _____mL	点滴	90 分
⑥	KCL(20mEq/20mL) ソルデム 1	0.5A 500mL	点滴	90 分
⑦	ソルデム 1	500mL	点滴	90 分
⑧	ヘパリン Na ロック	1 本	静注	フラッシュ用

Day3～4

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴 30 分
②	ソルデム 1	500mL	点滴 90 分
③	ヘパリン Na ロック	1 本	静注 フラッシュ用

Day5

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴 30 分

Day1, 8 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	レスタミンコーワ錠	5T	内服 PTX 投与 60 分前